

第 98 回 問 194

ジクロフェナクナトリウム錠の内服を開始した患者に対して、POS を利用した薬剤管理指導業務の一環として初期計画を立てた。計画の分類及び内容が正しいのはどれか。2つ選べ。なお、分類の OP、CP、EP はそれぞれ observational plan、care plan、education plan を表す。

- 1 OP —— 血便、黒色便の有無をモニターし、消化管障害によるものか否かを確認する。
- 2 CP —— 血便や黒色便の原因が消化管出血であれば、坐剤に変更する。
- 3 CP —— 重篤な肝障害の初期症状について患者とその家族に説明し、初期症状が見られたらすぐに連絡するよう指導する。
- 4 EP —— 空腹時の服用を避けるよう患者に説明する。
- 5 EP —— 過度の体温低下、虚脱、四肢冷汗に注意して患者の状態を観察するとともに、処方医にも同様の注意について情報提供する。

【解説】

初期計画は、OP (observational plan : 観察計画)、CP (care plan : ケア計画)、EP (education plan : 教育計画) の 3 つの情報に分類される。

OP : 身体症状や自覚症状、体調変化、検査値など、観察すべき事項を記載する

CP : 治療薬の選択など、治療の目的、治療の方針を記載する

EP : 副作用の初期症状や薬の服用法など、患者に対して指導すべきことを記載する

- 1 正 : 便の状態など観察すべき事項については、OP に記載する。
- 2 誤 : ジクロフェナクナトリウム錠の内服で消化管出血が起こった場合、ジクロフェナクナトリウム坐剤に変更することは不適切である。なお、本設問のような治療方針については CP に記載する。
- 3 誤 : 副作用の初期症状など患者に説明すべき事項については、EP に記載する。
- 4 正 : 薬の服用法など患者に説明すべき事項については、EP に記載する。
- 5 誤 : 患者の身体症状など観察すべき事項については、OP に記載する。

【解答】 1、4



yakugaku
lab

<http://yakugakulab.info>